CONTRIBUCIÓN AL CONOCIMIENTO DE LA FLORA DEL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS EN LA PROVINCIA DE JAÉN

Rufino NIETO-OJEDA* et Alfredo BENAVENTE-NAVARRO**

** Centro de Capacitación y Experimentación Forestal;*
*** Agencia del Medio Ambiente. E-23470 Cazorla. Jaén (España)*

Blancoana 10: 69-70 (1992). ISSN 0212-8314
KEY WORDS: chorology, vascular plants, Segura and Cazorla (South east Spain)

Presentamos un listado de 28 especies interesantes para el Parque. Todas las localidades estan en el huso 30S de las coordenadas U.T.M.

Las siglas colocadas detrás de los nombres científicos indican el grado de amenaza a que está sometida en el Parque según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza: E: En claro peligro de extinción; R: rara; K: Insuficientemente conocida; N: Especie no amenazada; V: Vulnerable.

AQUILEGIA CAZORLENSIS Heywood (V)
Las citas de este endemismo, exclusivo del Parque, corresponden al Cerro Cabañas y sus proximidades. De forma escasa lo hemos localizado en los últimos años en otros puntos de las Sierras de Cazorla y del Pozo: Río Gualay y Cerrada del Pintor (WG 0584), 1984; Poyos de la Mesa (WG 0694), 1984; Río Guazalamanco (WG 0694), 1989; Barranco del Guadalentín, cerca de la peguera del Bailaor (WG 1392), 1989. (JAEN 911340)

AQUILEGIA VULGARIS L. **(R)**
Especie frecuente en las sierras de Segura, Acebeas, y Las Villas, arroyo de Gil Cobo, pero muy rara en la de Cazorla donde la hemos localizado recientemente en La Cabrilla (WG 1897), Nieto 30.VII.1990. (JAEN 911336)

ARCEUTHOBIUM OXYCEDRI (DC.) Bieb. (R)
Entre Almicerán y Torcales del Lobo (WG 1087), Nieto et Benavente 8.VI.1989. Especie nueva para el Parque donde es rara y aparecido exclusivamente sobre Juniperus oxycedrus. (JAEN 913082)

ASTRAGALUS LUSITANICUS Lam. (N)
Cerca de la Casa Forestal de Las Hoyas (Sierra de las Villas) (WH 1626), Benavente et Pérez Rivera 20.V.1989. Nueva en el Parque aunque relativamente frecuente en el lugar apuntado. (JAEN 900100)

CENTAUREA TOLETANA Boiss. et Reuter (R)
Entre Orcera y las Acebeas, montes (WH 1823) Benavente et Nieto 5.VI.1989 En poco número pero frecuente en el lugar señalado. (JAEN 911308)

CEPHALANTHERA RUBRA (L.) L. C. M. Richard (R)
Sierra de las Villas, cerca del Pantano del río Aguascebas, (WH 0311), Nieto 8.VI.1988; Sierra de Cazorla: entre el Prado de las Uvillas y Cañada de las Fuentes (WG 0188), Nieto 7.VI.1990; En Sacejo cerca del Parador de Turismo (WG 0395), Benavente 20.VI.1990. Parece la primera cita después de la de Benavente (1991: 16. Boletin de Ecología 24: 8-16) y es relativamente rara en el Parque.

CYPERUS DIFFORMIS L. (K).
Torre del Vinagre. Charca del Jardín Botánico (WH 1107), Luque y Benavente 20.VI.1986. Escaso y localizado. Parece nuevo en el Parque aunque puede ser más abundante.

EUONYMUS LATIFOLIUS Miller (E)
Cerrada de Utrero, cercanías (WG 0697), Nieto 12.IX. 1983. Este taxon es de sumo interés en la flora del Parque, ya que es el único lugar de la Península donde se ha encontrado. Anteriormente sólo se conocía de cerca del pico Cabañas. La nueva localización, muy distante de la primera, constituye un síntoma esperanzador para la futura conservación de la especie. De todos modos, la población en ambas localidades se reduce a unos pocos ejemplares relictos muy castigados por la presión de herbivoría en los últimos años. (JAEN 911338)

FUMANA BAETICA Güemes (R)
Puente de Guadahornillos, piso supramediterráneo (WG 1096), Benavente 15.VI.1990. Nueva especie

para la flora ibérica que encuentra en este Parque su máxima concentración de individuos. Coloniza generalmente las cumbres de la sierra, no saliendo del piso oromediterráneo. Esta nueva localidad puede considerarse como una excepción de su hábitat característico.

GERANIUM **MALVIFLORUM** Boiss. et Reuter (N)
Arroyo orca del pueblo de Cazorla (VG 9396), Nieto 10.V.1989. Esta localidad está fuera de los límites dei Parque.

HYOSCIAMUS ALBUS L. (N)
Segura de la Sierra, proximidades, lugares ruderalizados (WH 3039), Benavente y Nieto 4.VI.1988. Es el único lugar del Parque donde la conocemos.

LAVANDULA STOECHAS L. subsp. PEDUNCULATA. (Miller.) Samp. ex Rozeira (N)
Si$^{\underline{a}}$a Oruña, escaso (WH 2340), Sánchez Lara et Benavente 6.VL 1990. En el Parque sólo la hemos visto en este lugar.

LAVANDULA STOECHAS L. subsp. STOECHAS (N)
Entre Orcera y el río Madera, sobre materiales del Trías, asociado a Cistus ladanifer L. (WH 3343), Nieto y Benavente 5.VI.1989. Taxon nuevo para el Parque e interesante por ser propio de suelos con pH ácido.

LINARIA NEVADENSIS (Boiss.) Boiss. et Reuter (R)
Collado del Trabino, Campos de Hernán Perea (WG 0285), Benavente y Nieto 7.VI.1989. Relativamente frecuente en el piso bioclimático oromediterráneo. Parece nueva en el Parque.

LISTERA OVATA (L.) R. Br. (R)
Sierra de Segura, relativamente frecuente en las riberas del río Tus (WH 4143), Benavente et Nieto 9.VI.1988. (JAEN 911324)

MYRTUS COMMUNIS L. (N)
Sierra de las Villas, abundante en la cuenca alta del río Cañamares (WH 0005), Nieto 16.V.1985. Nuevo en el Parque y notable por ser una planta de suelos ácidos.

NARCISSUS PSEUDONARCISSUS L. (K)
Falda del cerro Gilillo, cortado rocoso (WG 9993), Nieto 27.IV.1988. Especie rara y muy localizada en el Parque. (JAEN 911341)

NEPETA NEPETELLA L. (K)
Cerca de Santiago de la Espada (WH 3814), Nieto y Benavente 21.VI.1989. Escaso en el Parque, la encontramos cerca de uno de sus límites.

NIGELLA DAMASCENA L. (N)
Sierra de las Villas, cerca del Embalse del río Aguascebas (WH 0411), Nieto 8.VI.1988.

ORIGANUM VULGARE L. (N)
Sierra de Segura, Sierra del Agua en la cuenca alta del río Segura (WH 3021), Nieto 20.VIII.1989; Sierra de Segura (WH 2030), Benavente y Luque 11.IX.1990. Podemos considerarlo escaso, pero extendido en la Sierra de Segura. (JAEN 911333)

PHYTEUMA ORBICULARE L. (N)
ALBACETE. Chorros del río Mundo, ripícola, cerca del Parque (WH 4956), Nieto 20.VI.1989. Consideramos que debe encontrarse, en el subsector Alcaracense, dentro del Parque. (JAEN 911335)

RIBES UVA-CRISPA L. (R)
Campos de Hernán Perea (WG 2199), Benavente y Nieto 10.V.1986. Escaso, asociado a Berberis hispanica Boiss. et Reuter y a otros caméfitos espinosos oromediterráneos. Parece nuevo en el Parque.

SALVIA ARGENTEA L. (N)
Frecuente en bordes de carreteras, olivares, como nitrófila (VG 9690) Nieto y Benavente 6.V.1987. En el interior del Parque: Sierra de Cazorla, Control de las Chozuelas; Sierra de Segura, cerca de Cortijos Nuevos. (JAEN 911328)

SEDUM **CAESPITOSUM** (Cav.) DC. (N)
Puerto de las Palomas, en una pradera sometida a pastoreo (WH 0500), Nieto 5.V1.1990. Escaso y muy localizado. Parece nuevo en el Parque.

SERAPIAS LINGUA L. (K)
Cerca del Embalse del Tranco, en suelo húmedo (WH 1823), Benavente y Nieto 5.VI.1989 Parece nuevo en el Parque donde es muy escaso

SIDERITIS GLACIALIS Boiss. (E)
Cerca de las Empanadas (WG 1896), Nieto y Carramiñana 30.VII.1990. Citado de antiguo en el Macizo. Se había dudado de su presencia por considerarse un endemismo exclusivo de Sierra Nevada y por no haberse encontrado aquí en los últimos años. (JAEN 911326) (JAEN 911337)

VERBASCUM HERVIERI Degen (E)
Sierra de Segura, entre las Acebeas y el río Tus (WH 4244), Nieto y Benavente 8.VII.1990. La dificultad de localización de este taxon estriba en que al ser una planta bianual suele cambiar de habitación con frecuencia, así como en requerir suelos algo movidos para establecerse. Por estos motivos, aunque en 1983 lo identificamos en la Sierra de Cazorla (WG 1394), llevamos varios años sin observarlo en la misma. (JAEN 911327)